

SISTEMA INTEGRAL MODELO PACHUCA CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA. TAMIZAJE NUTRICIONAL DE PEDIATRÍA.

Evalué en la admisión del paciente las siguientes preguntas.

PREGUNTA	RESPUESTA	PUNTAJE
1.- ¿El niño tiene un diagnóstico con complicación nutricional?	Definitivamente	3
	Probablemente	2
	No	0
2.- ¿Cuál es la ingesta nutricional del niño?	Ninguna	3
	Disminuyo recientemente	2
	Sin cambios	0
3.- Use las tablas de crecimiento y desarrollo de referencia rápida de percentiles para determinar las medidas del niño.	Desnutrición	3
	Riesgo nutricional	1
	Eutrófico	0

1.- ¿El niño tiene un diagnóstico con complicación nutricional?

Definitivamente.	Probablemente.	No
<ul style="list-style-type: none"> • Alergias alimentarias múltiples. • Cirugía importante. • Disfagia. • Enfermedad de Crohn. • Enfermedad hepática. • Enfermedad renal. • Error innato del metabolismo. • Fibrosis quística. • Oncología en tratamiento activo • Traumatismo grave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alergia alimentaria. • Cardiología. • Cirugía menor. • Condiciones neuromusculares. • Desordenes psiquiátricos. • Diabetes. • Enfermedad Celiaca. • Labio leporino y paladar. • Reflujo gastroesofágico. • Parálisis cerebral. • Virus respiratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cirugías ambulatorias. • Investigaciones.

3.- Use las tablas de crecimiento y desarrollo de referencia rápidas de percentiles para determinar las medidas del niño. (Peso para la talla.)

Desnutrición	Riesgo nutricional.	Eurotrófico
Se aleja tres espacios del percentil 50	Se aleja dos espacios del percentil 50	Se aleja 0 o 1 espacio del percentil 50

SCORE TOTAL

		Puntaje
1 =	¿El niño tiene un diagnóstico con complicación nutricional?	
2 =	¿Cuál es la ingesta nutricional del niño?	
3 =	Tablas de crecimiento y desarrollo de referencia rápida de percentiles para determinar las medidas del niño.	
Total de puntos =		

Tipo de riesgo	Puntaje	Recomendaciones de intervención
Riesgo alto	>4	<ul style="list-style-type: none"> • Remitir al departamento de nutrición • Revisar y supervisar el plan de atención semanalmente.
Riesgo medio	2-3	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisar la ingesta nutricional durante 4 días. • Repetir el tamizaje después de 3 días. • Mejorar el plan de cuidado según recomendaciones.
Riesgo bajo	0-1	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con la atención clínica. • Repetir semanalmente el tamizaje. • Mejorar plan de cuidados según necesidades.