



INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE RECETAS E INDICACIONES MEDICAS (MMU.1.1)

Departamento / Área: Servicios Médicos	Vigente a partir de: MARZO 2022	Clave: CEMA-DO-SM-ILRIM-02
	Versión: 3.0	Página 1 de 2

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE RECETAS E INDICACIONES MÉDICAS

1.- ORDEN

- 1.- DIETA
- 2.- SOLUCIONES
- 3.- MEDICAMENTOS
- 4.- MEDICAMENTOS ALTO RIESGO (AR)
- 5.- MEDIDAS GENERALES

2.- INDICACIONES GENERALES

- Escribir de forma legible.
- Comunicaciones orales claras.
- Escribir órdenes completas de medicamentos.
- No abreviar los nombres de los medicamentos.
- Especificar la vía de administración.
- Especificar la concentración del fármaco, ejemplo 100 miligramos
- Nunca abreviar la unidad como "U": deletrear "unidad".
- Nunca usar un cero final: 1 mg, no 1.0 mg.
- Nunca dejar un punto decimal "desnudo": use 0.25 mg o 250 microgramos, no .25mg.
- Especificar instrucciones para cuando se requieren medicamentos, donde se incluyen frecuencia, dosis diaria total e indicaciones de uso.

3.- NO SE DEBERÁ USAR ABREVIATURAS, EN SU CASO SE DEBERÁ PONER INDICACIÓN COMPLETA

- mg..... miligramos
- UI..... Unidades internaciones
- KCL.... Cloruro de Potasio

4.- LASA, DEL ACRÓNIMO (LOOK ALIKE, SOUND ALIKE)

Deberán identificarse con diferencia entre mayúsculas y negritas y con acrónimo al final.

- **DIFENHIDRAMINA 25 MILIGRAMOS VIA ORAL CADA 12HRS**
- dimenhidrinato 50 miligramos vía oral cada 8hrs

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
DR. LUIS JAVIER BATRESS HERNANDEZ RESPONSABLE DE SALUD Y SEGURIDAD	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO DE CEMA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE RECETAS E INDICACIONES MEDICAS (MMU.1.1)

Departamento / Área: Servicios Médicos	Vigente a partir de: MARZO 2022	Clave: CEMA-DO-SM-ILRIM-02
	Versión: 3.0	Página 2 de 2

5.- MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (AR).

Se incluirán en un apartado diferente al de medicamentos, sin abreviaturas y con acrónimo al final (AR).

 MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO	
ELECTROLITOS CONCENTRADOS	
AZUL	Bicarbonato de sodio al 7.5% solución inyectable de 10 mL y 50 mL
ROJO	Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq) solución inyectable de 5 mL
AMARILLO	Gluconato de calcio al 10% solución inyectable de 10 mL
VERDE	Sulfato de magnesio al 10% solución inyectable 10 mL
NARANJA	Fosfato de potasio al 15% solución inyectable de 10 mL y 50 mL
BLANCO	Cloruro de sodio al 17.7% solución inyectable de 10 mL
OTROS	
GRIS	Medio de contraste Gadobutrol de 7.5 mL, 15 mL y 30 mL
CAFÉ	Insulinas (de acción rápida e intermedia)
ROSA	Heparina 1000 y 5000 Unidades Internacionales solución inyectable
MORADO	Solución glucosada al 50% solución inyectable de 50 mL

6.- LAS INDICACIONES VERBALES O VÍA TELEFÓNICA

Serán reportadas en Bitácora de registros comunicación efectiva (de resultados emitidos vía verbal o telefónica) CEMA-RG-LAC-CE-10/ V.1.1 con nombre de quién indica, de quién recibe, así como firma y cédula de quién recibe, para posteriormente ser firmadas por el tratante esto en formato de indicaciones.

14:30 17/10/18

Dr. José María Busto.- recibe indicaciones Dr. Luis Batress
Captopril 25 miligramos vía oral en caso de necesidad

7.- CUALQUIER ERROR O FALLA EN LA PRESCRIPCIÓN SE DEBERÁ TACHAR Y CREAR NUEVA INDICACIÓN.

**ATTE.
SERVICIOS MÉDICOS CEMA**

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
DR. LUIS JAVIER BATRESS HERNANDEZ RESPONSABLE DE SALUD Y SEGURIDAD	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO DE CEMA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA